

Que pouvez-vous faire pour prévenir la péritonite?

Avant un échange/ l'installation du cycleur



- **LAVEZ-VOUS LES MAINS**
 - C'est votre **MEILLEURE** défense!
 - Utilisez du savon liquide
- **Essuyez-vous** les mains
 - Utilisez un essuie-tout ou une serviette **propre** (*pas vos vêtements*)
- Procédez à l'échange du TwinBag ou programmez votre cycleur HomeChoice exactement comme on vous l'a enseigné
- Procédez aux échanges dans un environnement propre, sec et bien éclairé*
- Apprenez à reconnaître ce qui est « stérile » et évitez de toucher les parties stériles

Pendant un échange/ l'installation du cycleur



- Vérifiez le liquide de dialyse pour voir s'il est trouble
- Ne laissez pas rentrer d'animaux de compagnie dans la pièce lorsque vous :
 - programmez le système
 - procédez à un échange*
 - êtes « connecté » (*toute la nuit si vous êtes connecté au cycleur*)
- Éteignez les ventilateurs, et fermez portes et fenêtres

Soins quotidiens



- Fixez solidement le cathéter (*pour éviter qu'il ne pende*)
- Inspectez et nettoyez le site d'émergence chaque jour, comme on vous l'a enseigné
- Les pansements sales ou humides doivent être changés
- Appelez l'infirmière de DP si vous remarquez une fuite du liquide au niveau du cathéter ou du site d'émergence
- Vérifiez l'adaptateur en titane et le branchement de la ligne de transfert chaque jour
- Évitez la constipation

QUESTION	RÉPONSE
Qu'est-ce que la péritonite?	La péritonite est une infection de la cavité péritonéale. Elle doit être traitée par des antibiotiques.
Comment reconnaît-on une péritonite?	<p>Les symptômes suivants indiquent que vous avez peut-être une péritonite :</p> <ul style="list-style-type: none"> – liquide de dialyse trouble – douleurs et sensibilité abdominales – nausées et vomissements – fièvre et frissons
LE PROBLÈME	CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
Le liquide de dialyse est trouble.	Suivez les directives de l'hôpital pour savoir qui vous devez appeler. Appelez immédiatement. C'est une URGENCE.
Vous prenez des antibiotiques depuis 2 ou 3 jours pour traiter une péritonite, mais le liquide de dialyse est toujours trouble.	Suivez les directives de l'hôpital pour savoir qui vous devez appeler. Appelez immédiatement. C'est une URGENCE.

* Ces directives se rapportent à l'échange du TwinBag et à l'installation du cycleur HomeChoice.

Ce document est fondé sur des résultats scientifiques publiés (disponibles en 2009) et sur des lignes directrices cliniques provenant d'organisations professionnelles. Il s'agit d'une ressource parmi un ensemble de facteurs qui interviennent dans la prise en charge des patients en DP et il ne remplace pas le jugement médical et clinique. De plus, les particularités de chaque patient doivent être prises en compte, ainsi que les lignes directrices des sociétés de néphrologie régionales et celles des autres organisations. Ne pas se fier uniquement à ce document.

Références

1. Organisation mondiale de la Santé. WHO guidelines on Hand Hygiene in Healthcare http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf
2. Li PK, Szeto CC, Piraino B et al. Peritoneal dialysis-related infections recommendations: 2010 update. Peritoneal Dialysis International, Vol. 30, pp. 393–423.
3. Bender FH, Bernardini J, Piraino B. Prevention of infectious complications in peritoneal dialysis: best demonstrated practices. Kidney Int Suppl. 2006 Nov;(103):S44-54.

Baxter

Corporation Baxter
Mississauga (Ontario) 1-800-387-8399
www.baxter.ca

Baxter est une marque de commerce de Baxter International Inc. PD-T-13F 01/11